

INTESTINO DELGADO
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Lee y sigue todas las instrucciones con atención

Importante: No desayunes el día anterior al procedimiento

COMPRA EN LA FARMACIA

1- Bote MiraLAX de 119 gramos (sin receta)

Al menos 32 onzas de una bebida deportiva de tu elección (de cualquier color excepto rojo)

2 pastillas de Zofran (receta para las náuseas)

PREPARACIÓN PARA TU PROCEDIMIENTO

- Si **no** tienes evacuaciones regulares y diarias, o tomas un medicamento GLP1, avísanos. Necesitarás instrucciones diferentes para que el examen sea exitoso.
- **Continúa con todos** los medicamentos con aspirina y antiinflamatorios, incluyendo ibuprofeno, Motrin, Aleve, naproxeno, Naprosyn, sulindac, piroxicam, feldeno, indometacina, diclofenaco y voltaren. El paracetamol también es seguro para continuar.
- Si tomas un **anticoagulante recetado, necesitarás instrucciones de retención de nuestra consulta.**
- Organiza que un conductor te lleve a casa tras el procedimiento. No se te permitirá conducir tras recibir la sedación.
- Si tienes **diabetes** o estás tomando medicación para perder peso, utiliza las siguientes instrucciones:
 - Para este procedimiento es necesario ayunar (prescindir de comida), controla tu glucosa en sangre y sigue estas instrucciones
 - **GLP-1 - PARADA 7 días antes del procedimiento.** (ej: Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, Trulicity, Semaglutide, Tirzepatida)
 - **SGLT2 - Suspensión 3 días antes del procedimiento** (ej: Jardiance, Farxiga, Invokana, Steglatro, Brenzavvy, Glyxambi, Synjardy, Xigduo, Qtern)
 - Otros medicamentos orales para la diabetes: no los tomes la mañana del procedimiento.
 - Bomba de insulina: Déjala encendida, si tienes dudas consulta con tu endocrinólogo.
 - Insulina de acción prolongada: media dosis la noche antes del procedimiento. No tomes la mañana del procedimiento.
 - Insulina de acción corta: dosifica según sea necesario con monitorización de la glucosa en sangre.
 - Si te preocupa que baje tu azúcar en sangre, considera comprar pastillas de glucosa.

**LLAMA DE LUNES A VIERNES DE 7 AM a 5 PM
O LLAMA A NUESTRO NÚMERO FUERA DE HORARIO**

Centro de Endoscopia Meridiana	(208) 695-2100
Centro de Endoscopia de Boise	(208) 342-7169
Centro de Endoscopia del Condado de Canyon	(208) 954-8218
Centro de Endoscopia de 10 Millas	(208) 565-5035
Fuera de horario	(208) 343-6458

7 DÍAS ANTES DE TU PROCEDIMIENTO

- **SUSPENDE TODOS LOS MEDICAMENTOS GLP-1 7 días antes del procedimiento.**
- **STOP los medicamentos SGLT2 3 días antes del procedimiento.**

5 DÍAS ANTES DE TU PROCEDIMIENTO

- Nada de frutos secos ni semillas.
- Deja todos los suplementos de fibra, incluyendo Metamucil, Citrucel, Benefiber, FiberChoice y semillas de lino. Si los tomas para tratar el estreñimiento, toma 17g diarios de MiraLAX a partir de cinco días antes del procedimiento en lugar de la fibra. (Esto requerirá que compres MiraLAX además de la preparación intestinal mencionada anteriormente).
- Deja de tomar todas las vitaminas y suplementos a base de aceite, incluyendo vitaminas A, D, E, aceite de pescado, etc.

EL DÍA ANTES DE TU PROCEDIMIENTO

- Desde el momento en que despiertas, empieza una dieta de líquidos claros. No desayunes. Evita las bebidas rojas.

- Líquidos claros solo por boca. Esto incluye zumos claros (manzana, uva, naranja colada, limonada colada), té, café (sin leche ni nata), refrescos, bebidas deportivas (Gatorade, Powerade), caldo o caldo claro, gelatina y polos de hielo.
- Evita las bebidas rojas, la gelatina roja y los productos lácteos.
- **Consume grandes cantidades de líquidos claros para aumentar el éxito del lavado de las deposiciones, ayudar a evitar el hambre y evitar la deshidratación.**
- **A las 17:00, mezcla la botella completa de MiraLAX (119 g) con 32 onzas de la bebida deportiva que prefieras. Agita hasta que esté completamente disuelta.**
 - Para reducir la probabilidad de náuseas, puedes tomar una pastilla de Zofran 30-60 minutos antes de tomar tu preparación. Si te sientes mareado o vomitas, puedes repetir Zofran x1.
 - Bebe un vaso de 8 onzas cada 10-15 minutos hasta que termines el de 32 onzas. **Es necesario beber TODO el frasco, incluso si tus intestinos parecen limpios.**
- Si no aparecen heces en las 2 horas siguientes a la finalización, repite **este paso**. Esto requerirá que compres más MiraLAX y bebida deportiva.
- Si experimentas náuseas mientras tomas tu preparación, deja de beber y deja que las náuseas se asimen. Puedes tomar una segunda pastilla de Zofran para ayudar a aliviar las náuseas. Cuando vuelvas a beber, bebe más despacio o con pajita para evitar las náuseas. Si se produce vómito, por favor llámanos a los números mencionados arriba.
- Sigue bebiendo líquidos claros. Esto ayuda a que tu preparación sea más exitosa.

EL DÍA DE TU PROCEDIMIENTO

- Por favor, continúa consumiendo líquidos claros tras completar la preparación para evitar deshidratación hasta 4 horas antes del procedimiento programado.
- **4 horas antes del procedimiento, DEJA de beber líquidos. Solo puedes tomar pequeños sorbos de agua para tomar los medicamentos prescritos; esto es muy importante. Beber dentro de las 4 horas posteriores al procedimiento puede provocar retrasos o cancelaciones.**
- Lleva una lista de tus medicamentos actuales y las dosis correctas a tu cita.
- **PROHIBIDO CONDUCIR: no puede conducir el resto del día si está sedado.** Necesita un conductor responsable que le acompañe a casa tras el procedimiento. Si su conductor desea hablar con el médico sobre los resultados del procedimiento, por favor pídele acompañarte y **permanecer en el lugar.**
- No recomendamos Uber, Lyft ni tomar un taxi; estos no son medios de transporte aceptables.
- Será sedado durante el procedimiento. **Por favor, evite el alcohol y tomar decisiones legales durante el resto del día después del procedimiento.**

CONSEJOS ÚTILES

- **Medicamentos STOP GLP-1 7 días antes de tu procedimiento**
- **Medicamentos STOP SGLT2 3 días antes del procedimiento**
- Líquidos claros solo el día antes de tu examen, es decir, nada de alimentos sólidos para el desayuno, la comida o la cena, **solo líquidos.**
- Debes completar **toda la preparación intestinal.** A menudo vemos malas preparaciones intestinales porque los pacientes dejan de beber.
- Si tienes problemas para beber la preparación, prueba a chupar con hielo o una rodaja de limón, lávate los dientes, mastica chicle o enjuágate la boca.
- Si terminas toda la preparación y tus heces están marrones, gruesas o no están claras, por favor llámanos para pedir consejo.
- Si tienes náuseas o vomitas con la preparación, deja de beber para que tu estómago se calme y toma el Zofran que te ofrecemos
- Puede que no recuerdes la conversación con tu médico después del procedimiento; recomendamos ENCARECIDAMENTE que tu conductor permanezca EN nuestro centro para hablar con el médico después de la prueba.
- ❖ **El tiempo de su procedimiento será aproximadamente 90 minutos desde la hora programada para el registro para el alta en los Centros de Endoscopia. Por favor, coordine con su conductor para evitar retrasos en el alta. Los tiempos de estancia de los pacientes para los procedimientos hospitalarios pueden ser más largos.**
- ❖ **No podemos hacernos responsables de sus objetos de valor (*relojes o diversas joyerías*). Por favor, déjelos en casa.**
- ❖ **Lleva todas las tarjetas de seguro y un documento de identidad con foto. Por favor, consulta con tu compañía de seguros sobre la autorización previa. Se requiere una tarifa por servicios en el momento del check-in. Por favor, prepárate para realizar un pago.**

425 W. Bannock • Boise, Idaho 83702
2235 E. Gala • Meridian, Idaho 83642
1216 Garrity • Nampa, Idaho 83687



Teléfono: 208.343.6458
Fax: 208.343.5031
Web: IdahoGastro.com

- ❖ **IGA reconoce que tu tiempo es valioso, y el nuestro también. Si necesitas cancelar o reprogramar una cita, hazlo con más de 48 horas laborables antes de la hora programada de llegada al 208-343-6458. Las cancelaciones tardías y las ausencias pueden cobrar una tarifa de 200 \$.**