

Directrices de medicación previa al procedimiento

Fentermina y GLP-1 Medicamentos que incluyen, pero no se limitan a:

PARADA 7 DÍAS antes del procedimiento

Inyección semanal

- Ozempic (semaglutida)
- Wegovy (semaglutida)
- Mounjaro (tirzepatida)
- Zepbound (tirzepatida)
- Trulicity (dulaglutida)
- Bydureon BCise (exenatida de liberación prolongada)
- Retatrutida

Inyección diaria

- Victoza (liraglutida)
- Saxenda (liraglutida)
- Adlyxina (lixisenatida)
- Byetta (exenatida)

GLP-1 oral diario

- Rybelsus (GLP-1 oral – semaglutida)

Supresor del apetito

- Fentermina

Medicamentos SGLT2 que incluyen, pero no se limitan a:

PARA 3 DÍAS antes del procedimiento.

- Jardiance (empagliflozin)
- Farhiga (dapagliflozin)
- Invokana (cangliflozin)
- Steglatro (ertugliflozin)
- Glixambi (empagliflozina/linagliptina)
- Synjardy (empagliflozina/metformina)
- Xigduo (dapagliflozina/metformina)
- Qtern (dapagliflozina/saxagliptina)
- Puedes retomar tu dosificación normal una vez finalizado el procedimiento y retomado una dieta normal.

Insulina

Si normalmente tomas una dosis de insulina por la noche

- Por la noche antes del procedimiento, tomarás solo la mitad de tu dosis habitual. Por ejemplo, si tomas 10 unidades para la dosis de la noche, solo tomarás 5 unidades.
- Por la mañana del día de tu procedimiento, NO tomarás insulina. Una vez completado el procedimiento y retomes una dieta normal, podrás retomar tu dosis habitual de insulina.

Bomba de insulina

- Tendrás que controlar tus niveles de azúcar en sangre con más frecuencia a lo largo del día y puede que tengas que ajustar la insulina en consecuencia porque estarás a dieta líquida.
- Si tienes más preguntas, por favor contacta con tu endocrino o médico que te lo prescriptora.

Anticoagulantes (anticoagulantes) que incluyen, pero no se limitan a:

Recibirás instrucciones de espera de nuestra oficina.

- Heparina
- Coumadin
- Jantoven (Warfarina)
- Plavix (Clopidogrel)
- Effient (Prasugrel)
- Eliquis (apixaban)
- Tricagrelor (Brilinta)
- Pardaxa (Dabigatran)
- Savaysa (edoxaban)
- Xarelto (rivaroxaban)
- Edoxaban (Lixiana)

Vitaminas liposolubles/a base de aceites, incluyendo, pero no limitándose a:

PARADA 5 DÍAS antes del procedimiento

- Aceite de pescado/krill
- Vitaminas E, D, A
- Enzima Co Q10
- IRON

Inhibidores y estimulantes de la fosfodiesterasa incluyendo, pero no limitado a:

PARADA 24 HORAS antes del procedimiento

Inhibidores de la fosfodiesterasa

- Avanafil (Stendra)
- Tadalafil (Cialis, Adcirca)
- Sildenafil (Viagra)

TDAH/Estimulantes

- Adderall
- Vyvanse

Narcóticos incluyendo, pero no limitado a:

PARADA 4 HORAS antes del procedimiento

- Oxycodona (OxyContin, Roxicodona y Percocet)
- Morfina (MS Contin y Kadian)
- Fentanilo (Actiq, Fentora, Duragesic, Subsys, Abstral y Lazanda)
- Meperidina (Demerol)
- Tramadol (Ultram, Ultracet y Ryzolt)
- Buprenofina (Sublocade, Belbuca, Probuphine, Buprenex)
- Hidrocodona (Vicodin, Norco, Lortab)
- Hidromorfona (Dilaudid y Exalgo)
- Codeína
- Metadona (Dolofina y Metadosa)
- Oximorfona (Opana)
- Carfentanilo (Carfentanilo, Wildnil)

Relajantes musculares incluyen, pero no limitados a:

PARADA 4 HORAS antes del procedimiento

- Carisoprodol (Soma)
- Metaxalona (Esquelaxina)
- Tizanidina (Zanaflex)
- Metocarbamol (Robaxin)
- Ciclobenzaprina (Flexeril, Amrix, Fexmid)
- Baclofen
- Dantrolene (Dantrium, Revonto, Ryanodex)

Las benzodiaceprinas incluyen, pero no limitándose a:

PARADA 4 HORAS antes del procedimiento

- Alprazolam (Xanax)
- Clorazepato (Tranxene)
- Lorazepam (Ativan)
- Estazolam
- Quzepam (Doral)
- Triazoam (Halcion)
- Oxazepam
- Clordiazepóxido (Librium)
- Diazepam (Valium, Valtoco)
- Clonazepam (Klonopin)
- Clobazam (Onfi, Sympazan)
- Temazepam (Restoril)
- Midazolam (Nayzilam, Seizalam)